

УТВЕРЖДЕНА  
приказом Председателя  
Комитета фармации  
Министерства здравоохранения  
Республики Казахстан  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
№ \_\_\_\_\_

**Инструкция по медицинскому применению  
лекарственного средства**

**Аммиак раствор 10 %**

**Торговое название препарата**

Аммиак раствор 10 %

**Международное непатентованное название**

Нет

**Лекарственная форма**

Раствор 10 %

**Состав**

100 мл раствора содержат

*активное вещество*- аммиака раствор концентрированный 40 мл

*вспомогательное вещество* – вода очищенная до 100 мл

**Описание**

Бесцветная прозрачная, летучая жидкость с острым запахом, сильно щелочной реакции.

**Фармакотерапевтическая группа.**

Стимуляторы дыхательного центра

Код АТХ R07AB

**Фармакологические свойства**

Действие препарата обусловлено на рефлекторном возбуждении дыхательного центра, действуя через рецепторы верхних дыхательных путей (окончания тройничного нерва).

Раздражает рецепторы кожи, расширяет сосуды, улучшает трофику и регенерацию тканей. При вдыхании вызывает раздражение слизистой оболочки дыхательных путей и рефлекторно возбуждает дыхательный и сосудодвигательный центры. Оказывает дезинфицирующее действие на кожу.

## **Показания к применению**

- для возбуждения дыхания и выведения больных из обморочного состояния
- укусы насекомых
- в хирургической практике применяют для мытья рук по методу С.И. Спасокукоцкого и И.Г. Кочергина.

## **Способ применения**

Для возбуждения дыхания: смачивают ватный или марлевый тампон препаратом и осторожно подносят к носовым отверстиям на 0,5 -1 сек. В хирургической практике для приготовления раствора для мытья рук 25 мл препарата разводят в 5 литрах теплой кипяченой воды. При укусах насекомых - в виде примочек.

## **Побочные действия**

- зуд, гиперемия, отек
- при вдыхании больших концентраций паров аммиака возможно развитие запредельного торможения и рефлекторная остановка дыхания.

## **Противопоказания**

- повышенная чувствительность к препарату
- нарушение целостности кожных покровов
- заболевания кожи при местном применении: дерматиты, дерматозы, экзема

## **Лекарственные взаимодействия**

Не выявлены

## **Особые указания**

С осторожностью применение в период беременности и лактации, в детском возрасте

## **Передозировка**

*Симптомы:* усиление побочных реакций

*Лечение:* при остановке дыхания следует вводить дыхательные analeптики (кофеин, кордиамин), проводить искусственное дыхание. Симптоматическая терапия.

## **Форма выпуска и упаковка**

По 10 мл, 20 мл, 40 мл во флаконы из оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренными полиэтиленовыми пробками и крышками, навинчиваемыми пластмассовыми или во флаконы из пластмассы с укупоренными пробками из полиэтилена с навинчивающими крышками.

Флаконы упаковывают в коробки из картона коробочного с инструкцией по применению на государственном и русском языках.

**Условия хранения**

Хранить в защищенном от света месте при температуре от 18 °С до 25 °С.  
Хранить в недоступном для детей месте!

**Срок хранения**

2 года

По истечении срока хранения препарат не использовать

**Условия отпуска**

Без рецепта

**Производитель**

ТОО «Султан», Казахстан

Алматинская область, Талгарский район,  
с.Еркин, ул.Б.Момышулы, 5.

**Наименование и страна владельца регистрационного удостоверения**

ТОО «Султан», Казахстан

*Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции (товара) и ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного средства*

ТОО «Султан», Республика Казахстан, Алматинская область,

Талгарский район, с.Еркин, ул.Б.Момышулы, 5

Тел./факс 7 727 305-48-65/-80, 304-98-32

Адрес электронной почты: [toosultan@list.ru](mailto:toosultan@list.ru)