

УТВЕРЖДЕНА
Приказом председателя
Комитета фармации
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
от «_____» _____ 20__ г
№ _____

**Инструкция по медицинскому применению
лекарственного средства
Спирт этиловый**

Торговое название
Спирт этиловый

Международное непатентованное название
Нет

Лекарственная форма
Раствор 70 % и 90 %, 50 мл, 100 мл

Состав

1000 г препарата содержит	90 %	70 %
<i>активное вещество</i> - спирт этиловый 96 %	913.0 г	665.0 г
<i>вспомогательное вещество</i> - вода очищенная	87.0 г	335.0 г

Описание
Бесцветная, прозрачная жидкость с характерным спиртовым запахом и жгучим вкусом, легко воспламеняется, горит синеватым слабо светящимся бездымным пламенем.

Фармакотерапевтическая группа
Препараты для лечения заболеваний кожи. Антисептики и дезинфицирующие препараты. Антисептики и дезинфицирующие препараты прочие. Этанол
Код АТХ D08AX08

Фармакологические свойства
Фармакокинетика

При наружном применении частично всасывается через кожу и слизистые оболочки. В метаболизме препарата участвует изофермент CYP2E1, индуктором которого он является.

Фармакодинамика

Противомикробное средство, при местном применении оказывает антисептическое действие (денатурирует белки микроорганизмов). Активно в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий и вирусов. Антисептическая активность повышается с увеличением концентрации этанола. Для обеззараживания кожи используют 70 % раствор, проникающий в более глубокие слои эпидермиса лучше, чем 90 %, обладающий дубящим действием на кожу и слизистые оболочки. Раздражающий эффект этанола тесно связан с его способностью легко растворяться в липидах и быстро проникать в глубокие слои кожи.

Показания к применению

В медицинской практике спирт этиловый применяют - как наружное антисептическое и раздражающее средство для обтираний, компрессов.

Способ применения и дозы

Только наружно! Наружно – наносят на кожу с помощью ватных тампонов, салфеток. Для компрессов (во избежание ожога) этанол следует разбавить водой в соотношении 1:1 (70%, 90%).

Применение в педиатрии

Возможно применение в детском возрасте для компрессов в разведении 1:4(спирта и воды) – для 90% раствора, 1:3 (спирта и воды) – для 70% раствора.

Побочные действия

- аллергические реакции
- раздражение, сухость и ожоги кожи, слизистых оболочек и дыхательных путей
- болезненность в месте наложения компресса
- может оказывать резорбтивное общетоксическое действие
- угнетает ЦНС

Противопоказания

- гиперчувствительность к препарату

Лекарственные взаимодействия

При одновременном применении с препаратами для наружного применения, содержащими органические соединения, может денатурировать белки.

Особые указания

Для компрессов (во избежания ожога) этанол следует разбавить водой в соотношении 1:1 (70%, 90%).

Беременность, период лактации

Применять с осторожностью

Детский возраст

Возможно применение в детском возрасте для компрессов в разведении 1:4 (спирта и воды)

Для стерилизации хирургического инструментария используется неразведенный 95% спирт.

Использовать вдали от огня, легко воспламеняется.

Передозировка

При местном применении передозировка маловероятна.

Форма выпуска и упаковка

По 50 мл, 100 мл во флаконы из темной стекломассы с винтовой горловиной, укупоренные полиэтиленовыми пробками и крышками, навинчиваемыми пластмассовыми. Групповая упаковка и транспортная тара с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках.

Условия хранения

Хранить в сухом месте, вдали от огня, при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок хранения

3 года

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Без рецепта- 50 мл

По рецепту – 100 мл

Производитель

ТОО «Султан», Казахстан , Алматинская область, Талгарский район, с.Еркин, ул. Б.Момышулы, 5

Владелец регистрационного удостоверения

ТОО «Султан», Казахстан

Наименование, адрес и контактные данные (телефон, факс, электронная почта) организации на территории Республики Казахстан, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств от потребителей и ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного средства:

ТОО «Султан», Казахстан, Алматинская область, Талгарский район,
с.Еркин, ул. Б.Момышулы, 5
Тел./ факс: (727) 305-48-65/-80, 304-98-32
E-mail: toosultan@list.ru