

БАД

Сироп Девясила с витамином С.

Описание

Густоватая, однородная, непрозрачная жидкость, светло-коричневого цвета своеобразного вкуса, свойственного корням девясила. В процессе хранения допускается образование осадка, не влияющего на качество и годность сиропа.

Состав

Сахарный сироп, экстракт девясила сухой, аскорбиновая кислота, сорбат калия (консервант).

Свойства

Аскорбиновая кислота способствует повышению сопротивляемости организма к неблагоприятному воздействию окружающей среды, улучшает общее самочувствие, аппетит, увеличивает эффективность действия других компонентов препарата.

Отхаркивающее, противовоспалительное, антисептическое, фунгицидное, заживляющее, общеукрепляющее, гипотензивное свойство обусловлено содержанием сесквитерпеновых лактонов, полисахаридов, органических кислот.

Показания

Рекомендуется в качестве дополнительного источника аскорбиновой кислоты, сесквитерпеновых лактонов (алантолактона, изолактона, дигидроизоланталактона, дигидроланталактона, азулена), полисахаридов (инулина, пектина), органических кислот.

Пищевая ценность

Энергетическая ценность, ккал/кДж 265/1109
Белков 0.4 %, жиров 0 %, углеводов 66.0 %, аскорбиновой кислоты 0.3 %

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость компонентов, сахарный диабет, беременность, период лактации.

Рекомендации по применению

Сироп девясила принимают за 30 мин до еды. Детям старше 14 лет и взрослым – по 1 столовой ложке 3 раза в день; Содержимое флакона рекомендуется взбалтывать перед каждым употреблением.

Форма выпуска

Сироп по 100 мл во флаконах темного стекла вместе с инструкцией по применению.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C и относительной влажности не более 75 %. При хранении сиропа допускается выпадение осадка.

Срок годности

2 года

Условия реализации

Через аптечную сеть

Условия отпуска

Без рецепта

Производитель и организация, принимающая претензии от потребителей по качеству товара:
ТОО «Султан», Алматинская область, Талгарский район, с.Еркин, ул. Б.Момышулы, 5
Тел./факс +7 (727) 305-48-80/-65, 304-98-32
Адрес электронной почты: toosultan@list.ru

ББК

Витамин С қосылған андыз шәрбаты

Сипаттамасы

Андыз тамырларына тән дәмі бар ашық-қоңыр түсті, бірыңғай, мөлдір емес, қоюлау сұйықтық. Шәрбатты сақтау мезгілінде сапасына және жарамдылығына әсер етпейтін тұнба түзілуі мүмкін.

Құрамы

Қант шәрбаты, андыздың тарам тамырлары мен тамырларының құрғақ сығындысы, аскорбин қышқылы, калий сорбаты (консервант) бар.

Қасиеттері

Аскорбин қышқылы қоршаған ортаның қауіпті әсеріне қарсыластықты жоғарылатады, жалпы жағдайды, тәбетті жақсартады, препараттың басқада компоненттерінің әсерін көбейтеді.

Құрамында сесквитерпенды лактондар, полисахаридтер, органикалық қышқылдардың болуына байланысты қақырық түсіретін, қабынуға қарсы, антисептикалық, фунгицидтық, жара жазғыш, гипотензивты әсерлері бар.

Қолданылуы

Аскорбин қышқылы, сесквитерпенді лактондар (алантолактон, изолактон, дигидроизолактон, дигидроланталактон, азулен), полисахаридтер, органикалық қышқылдардың қосымша көзі ретінде ұсынылады

Тамақ құндылығы

Энергетикалық құндылығы,
ккал/кДж 265/1109
ақуыздар 0.4 %
майлар 0 %
көмірсулар 66.0 %
аскорбин қышқылы 0.3 %

Өндіруші және тұтынушылардан өнімнің (тауардың) сапасы жөнінде шағымдарды қабылдайтын ұйымның мекенжайы:

«Султан» ЖШС, Алматы облысы, Талғар ауданы, Еркін ауылы, Б. Момышұлы көшесі, 5.
Тел./факс +7 (727) 305-48-80/-65, 304-98-32 E-mail: toosultan@list.ru

Қолдануға болмайтын жағдайлар

- препараттың құрамдас бөліктеріне жоғары сезімталдықта
- қант диабеті
- жүктілік, лактация кезеңінде

Қолдану тәсілдері

Шәрбатты тамақтанарға дейін 30 минут бұрын тағайындайды.

14 жасан асқан балаларға және ересектерге тәулігіне 3рет 1 ас қасық шәрбаттан қолдану керек.

Құтының ішіндегісін әр қолданар алдында шайқау керек

Шығарылу түрі

Қоңыр түсті шыныдан жасалған құтыда 100 мл- дан, қолданылуы жөніндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапқа салынған.

Сақтау шарттары

Қурғақ, жарықтан қорғалған жерде +25°C-ден аспайтын температурада және 75 % аспайтын салыстырмалы ылғалдықта сақтау керек. Шәрбатты сақтау мезгілінде тұнба түзілуі мүмкін.

Сақтау мерзімі

2жыл.

Таратылу шарттары

Дәрйхана жүйесі арқылы

Босатылу шарттары

Рецептісіз

ИНСТРУКЦИЯ
по применению дезинфицирующего средства
«Мирамисан, раствор 0,01%» производства
ТОО «Султан», Республика Казахстан

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Средство «Мирамисан, раствор 0,01% и 0,1% для наружного применения» - бесцветная, прозрачная жидкость, пенящаяся при встряхивании, без запаха.

2. Срок годности средства составляет 3 года при условии хранения в не вскрытой упаковке производителя. Средство необходимо защищать от света и хранить в недоступном для детей месте при температуре от 1°С до 25°С.

3. В качестве активного вещества содержит 0,01 % и 0,1% бензил -диметил-[-3-(миристоил-амино)пропил]аммоний хлорида моногидрат соответственно.

4. Антисептическое и дезинфицирующее средство.

5. Мирамисан по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам – 4 класс опасности, в рекомендуемых дозах не оказывает резорбтивно-токсического, кожно-раздражающего и сенсibiliзирующего действия. При попадании в глаза вызывает раздражение.

6. Средство относится к группе катионных поверхностно-активных веществ, а именно к четвертичным аммониевым соединениям с антисептическим действием.

7. В основе действия мирамисана - прямое гидрофобное взаимодействие молекулы с липидными мембран микроорганизмов, приводящее к их фрагментации и разрушению.

В отличие от других антисептиков, Мирамисан обладает высокой избирательностью действия в отношении микроорганизмов, т.к. практически не действует на оболочки клеток человека. Данный эффект связан с иной структурой клеточных мембран человека (значительно большей длиной липидных радикалов, резко ограничивающих возможность гидрофобного взаимодействия мирамисана с клетками).

Мирамисан активен в отношении аскомицет, многих микроорганизмов, включая бактерии, патогенные грибы, вирусы, простейшие в виде монокультур и микробных ассоциаций, а также госпитальные штаммы с полирезистентностью к антибиотикам. Действует губительно на возбудителей заболеваний, передающихся половым путем: гонококки, бледные трепонемы, трихомонады, хламидии, а также на вирусы герпеса, иммунодефицита человека и др. Оказывает противогрибковое действие на дерматофиты, дрожжи и дрожжеподобные, а также другие патогенные грибы, включая грибковую микрофлору с резистентностью к химиотерапевтическим препаратам. Под действием мирамисана снижается устойчивость микроорганизмов к антибиотикам.

Мирамисан оказывает противовоспалительный эффект, усиливает местные защитные реакции, регенерационные процессы, активизирует механизмы иммунной защиты.

8. Средство выпускается в стеклянных флаконах из темного стекла с полиэтиленовой пробкой и навинчивающейся крышкой из с насадкой-распылителем, во флаконах-капельницах или во флаконах с насадкой-распылителем из крашеного полипропилена объемом от 30 мл до 1000 мл или в полимерных канистрах по 3 л, 5 л, 10 л, 20л.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для дезинфекции кожи рук медперсонала при обследовании больных и выполнении медицинских манипуляций.

Венерология. Для экстренной профилактики заболеваний, передающихся половым путем.

Гинекология. «Мирамисан, раствор 0,01%» при профилактике гнойного поражения послеродовых травм и заражений; воспаление влагалища, воспаление слизистой оболочки тела матки.

Урология. В составе комплексной терапии острых и хронических воспалений уретры и простаты (хламидиоз, гонорея и др.) применяется «Мирамисан, раствор 0,01%».

Неотложная помощь и применения в быту. Профилактика инфицирования микротравм кожи: порезы, царапины, ссадины. Универсальное средство личной гигиены.

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

Дезинфекцию кожи рук проводят путем нанесения 5 - 10 мл раствора 0,01% или 0,1% на предварительно тщательно вымытые и просушенные стерильной салфеткой руки, равномерно распределяя по всей поверхности, в течение 5 мин.

Венерология. Для срочной профилактики венерических патологий: по прошествии не более двух часов после полового акта, после гигиенической обработки наружных гениталий, раствор 0,01% обильно наносится на них пропитанным ватным тампоном. Мужчинам вводят в уретру 1,5-3 мл раствора 0,01%, женщинам – 1-1,5 мл; после процедуры не следует опорожнять мочевой пузырь в течение двух часов. Женщинам также орошают влагалище 5-10 мл раствора на 2-3 минуты.

Гинекология. Для профилактики послеродового инфицирования производится орошение влагалища раствором 0,01% за 6-7 суток до родов, во время родов – после каждого исследования влагалища, и после родов – по 50 мл раствора (тампон, смоченный в растворе, вводится во влагалище на 2 часа) в течение 5 суток. При проведении кесарева сечения, перед хирургическим вмешательством орошают влагалище, в ходе операции – внутреннюю часть матки и разрез на ней, а после операции во влагалище на 2 часа вводят тампоны, пропитанные в 50 мл раствора 0,01%. Процедура повторяется в течение 7-8 суток.

Воспалительные патологии женских гениталий: ежесуточное вагинальное введение тампонов, пропитанных раствором 0,01%, либо электрофорез в теч. 11-15 суток.

Урология. В комплексной терапии воспаления уретры и простаты осуществляется введение в мочеиспускательный канал 2-5 мл раствора 0,01% 1-3 раза в сутки. Продолжительность курса – 5-10 суток.

Неотложная помощь и применения в быту. С профилактической целью поверхность кожи в области микротравмы обрабатывают или фиксируют марлевым тампоном, смоченным средством Мирамисан 0,01% или 0,1%. Процедуру повторяют 2 - 3 раза в сутки в течение 3 - 5 дней.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Избегать попадания средства в глаза.

2. Не использовать средство при повышенной чувствительности к бензил -диметил-[-3-(миристоил-амино)пропил]аммония хлорида моногидрату.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

В отдельных случаях возможно кратковременное ощущение жжения, исчезающее самостоятельно через 15 - 20 с. и не требует прекращения лечения.

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

1. При попадании средства на слизистую оболочку глаз необходимо обильно промыть их водой. При необходимости обратиться к врачу.

2. При попадании средства в желудок дать выпить несколько стаканов воды, затем принять 10-15 таблеток активированного угля.

